

HINCHAZON DE LA INGLE O DEL ESCROTO (Groin or Scrotum Swelling)

Definición

Esta guía general contiene información sobre la presencia de hinchazón en el escroto (o la ingle) en los varones.

Causas

Las dos condiciones más comunes que causan hinchazón del saco escrotal son hidrocele y hernia. Vea el diagrama para la explicación.

Dos afecciones de emergencia que pueden manifestarse con hinchazón del escroto y dolor intenso son la torsión (rotación) del testículo y una infección del testículo (orquitis). En cada situación debe llamar a su doctor de inmediato.

Cuidado en caso de un hidrocele

Un hidrocele es una acumulación indolora de líquido claro arriba o alrededor del testículo. Es común en los varones recién nacidos. Un hidrocele en general desaparece sólo dentro de 6 a 12 meses. Necesita una operación después de 1 año si persiste la condición, o si la condición causa dolor al niño. Por estas razones, se lo mantiene bajo observación durante las visitas regulares. Si la hinchazón cambia frecuentemente de tamaño, también podría haber una hernia, y usted deberá llamar a su médico durante el horario normal para fijar una cita.

En caso que tiene una hernia, su hijo o hija requiere una operación.


Llame a su médico inmediatamente si:

- El área empeora de repente.
- La hinchazón provoca dolor o llanto.

Llame a su médico durante horas de oficina si:

- Todos los demás casos de hinchazón escrotal deben ser vistos por el médico, excepto un hidrocele que haya sido diagnosticado al nacer el bebé.

Instrucciones especiales:



Las Vegas Pediatric Urology

Andrew H. Hwang, M.D., FAAP, FACS

653 N. Town Center Dr., Suite 407. Las Vegas, NV 89144

Phone: 702-728-5686 Fax: 702-628-9030

Make appointment online: <http://www.patientfusion.com/doctor/andrew-hwang-md-73654>